

Linköpings universitet

Magnus Berggren, MAI

Tentamen i Matematik, fortsättningskurs. NMAA07/TEN1 2024-06-04, kl 14-18.

Inga hjälpmedel är tillåtna. Maclaurinutvecklingar bifogas, se baksidan.

Uppgifterna bedöms med 0 – 3 poäng.

För betyg n ($n = 3, 4$ eller 5) krävs minst $4(n-1)$ poäng.

- 1) Beräkna följande integraler

a) $\int_0^{\pi} x \sin 2x \, dx$ b) $\int_3^4 \frac{4}{x^2 - 4} \, dx$ c) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^4}} \, dx$

- 2) Räkna ut volymen av den rotations kropp som bildas då ytan mellan kurvan $y = \ln(1+x^2)$, $0 \leq x \leq 2$, x-axeln och linjen $x=2$ roterar ett varv kring y-axeln.
- 3) Bestäm största och minsta värde av funktionen $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 7$ på område som begränsas av linjerna $x = -1$, $x = 2$, $y = -1$ och $y = 2$. (Rita figur!)
- 4) a) Bestäm Maclaurinutvecklingen av ordning 3 med restterm i ordoform av

$$f(x) = e^{x^2} \sin x \quad (1p)$$

b) Funktionen f är definierad som $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x}-1}{\sin 5x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$

Hur ska konstanten a väljas för att f ska bli kontinuerlig för $x = 0$? (2p)


- 5) Bestäm den lösning till differentialekvationen $\frac{y'(x)}{\cos x} - y(x) = \sin x$ som uppfyller villkoret $y(\pi) = 0$
- 6) Genom ett klot med radie 2 cm borrar ett cylindriskt hål med radie 1 cm, på så sätt att cylinderns symmetriaxel går genom klotets medelpunkt. Bestäm volymen av den del som återstår.
- 7) Lös integralekvationen $\frac{2}{3} \int_1^{x^3} \frac{y(\sqrt[3]{t})}{t} dt + (x^2 + 1)y = 4$ och ange lösningens definitionsmängd.

(1a) $\int_0^{\pi} x \sin 2x dx = \int_{f=\sin 2x}^{g=x} \Rightarrow g' = 1 \Rightarrow F = -\frac{\cos 2x}{2} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2x dx = -\frac{\pi}{2} + \left(\frac{1}{4} \sin 2x\right)_0^{\pi} = -\frac{\pi}{2}$.


(1b) $\int_3^4 \frac{4}{x^2-4} dx = \int_3^4 \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}\right) dx = \left(\ln|x-2| - \ln|x+2|\right)_3^4 = \left(\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|\right)_3^4 = \ln \frac{2}{6} - \ln \frac{1}{5} = \ln \frac{5}{3}$.

(1c) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^4}} dx \Big|_{t=1+x^4} \Big|_{dt=4x^3 dx} = \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{4} (2\sqrt{t})_1^2 = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$.
 $x=0 \Rightarrow \alpha=1$
 $x=1 \Rightarrow \beta=2$

Svar: a) $-\frac{\pi}{2}$ b) $\ln \frac{5}{3}$ c) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$.

(2)  $dV = 2\pi x f(x) dx$ $V = 2\pi \int_0^2 x \ln(1+x^2) dx$
 $\Big|_{t=1+x^2} \Big|_{dt=2x dx} = 2\pi \int_1^5 \ln t \frac{dt}{2} = \pi \int_1^5 \ln t dt$
 $x=0 \Rightarrow \alpha=1$
 $x=2 \Rightarrow \beta=5$

$\Big|_{g=\ln t} \Big|_{g'=\frac{1}{t}} \Big|_{f=1} \Big|_{F=t} = \pi \left((t \ln t)_1^5 - \int_1^5 \frac{1}{t} \cdot t dt \right) = \pi (5 \ln 5 - (t)_1^5) = \pi (5 \ln 5 - 4)$
 $= \pi (5 \ln 5 - 4)$ (v.e.) Svar: $V = \pi (5 \ln 5 - 4)$

(3)  $f(x,y) = 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 7, -1 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 2$
 $\begin{cases} f'_x = 6x - 2y = 0 \\ f'_y = -2x + 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y = 0 \\ -x + 3y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 0$

$M_1 = (0,0) \Rightarrow \boxed{f(0,0) = -7}$

Randpunkter:

(AB): $y = -1 \Rightarrow f(x, -1) = 3x^2 + 2x - 4, -1 \leq x \leq 2$

$f'(x, -1) = 6x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$ ligger i $[-1, 2]$

(BC): $x = 2 \Rightarrow f(2, y) = 3y^2 - 4y + 5, -1 \leq y \leq 2$

$f'(2, y) = 6y - 4 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{2}{3}$ ligger i $[-1, 2]$

(DC): $y = 2 \Rightarrow f(x, 2) = 3x^2 - 4x + 5, -1 \leq x \leq 2$

$f'(x, 2) = 6x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$ ligger i $[-1, 2]$

(AD): $x = -1 \Rightarrow f(-1, y) = 3y^2 + 2y - 4, -1 \leq y \leq 2$

$f'(-1, y) = 6y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{3}$ ligger i $[-1, 2]$

$f(-\frac{1}{3}, -1) = -\frac{13}{3}$

$f(-1, -1) = -3$

$f(2, -1) = 12$

$f(2, \frac{2}{3}) = \frac{11}{3}$

$f(2, 2) = 9$

$f(\frac{2}{3}, 2) = \frac{11}{3}$

$f(-1, 2) = 12$

$f(-1, -\frac{1}{3}) = -\frac{13}{3}$

Svar: $f_{\max} = f(2, -1) = f(-1, 2) = 12$

$f_{\min} = f(0, 0) = -7$

4a) $f(x) = e^{x^2} \sin x = (1 + x^2 + O(x^4))(x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5)) = x + \frac{5x^3}{6} + O(x^5)$

4b) $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 5x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ För att f blir kontinuerlig för $x = 0$ behöver vi välja $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 5x}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 3x + O(x^2) - 1}{5x + O(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + O(x^2)}{5x + O(x^3)} =$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3 + O(x))}{x(5 + O(x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + O(x)}{5 + O(x^2)} = \frac{3}{5}$

Svar a) $f(x) = x + \frac{5}{6}x^3 + O(x^5)$ b) $\frac{3}{5}$

5) $\frac{y'}{\cos x} - y(x) = \sin x \Leftrightarrow y' - \cos x y = \sin x \cdot \cos x$

IF = $e^{-\sin x} \Rightarrow (y e^{-\sin x})' = \sin x \cos x e^{-\sin x}$

- 3 -

$$y e^{-\sin x} = \int \sin x \cos x e^{-\sin x} dx \quad \left| \begin{array}{l} t = \sin x \\ dt = \cos x dx \end{array} \right| =$$

$$= \int t e^{-t} dt \quad \left| \begin{array}{l} g = t \Rightarrow g' = 1 \\ f = e^{-t} \Rightarrow F = -e^{-t} \end{array} \right| = -te^{-t} + \int e^{-t} dt =$$

$$= -te^{-t} - e^{-t} + C = -\sin x e^{-\sin x} - e^{-\sin x} + C \Rightarrow$$

$$y = -\sin x - 1 + C e^{\sin x}$$

$$y(\pi) = 0 \Rightarrow 0 = -1 + C \Rightarrow C = 1 \Rightarrow \underline{\text{Svar}} \quad y = -\sin x - 1 + e^{\sin x}$$

⑥

$y = \sqrt{4-x^2}$ $T = (x, \frac{1+\sqrt{4-x^2}}{2})$

$$dV = \underbrace{\left(2\pi \cdot \frac{1+\sqrt{4-x^2}}{2}\right)}_{\text{TPvåg}} \cdot \underbrace{(\sqrt{4-x^2}-1)}_{\text{arean}} dx =$$

$$= 2\pi \frac{(4-x^2)-1}{2} dx = \pi (3-x^2) dx \Rightarrow V = \pi \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (3-x^2) dx =$$

$$= \pi \left(3x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}\pi \text{ (v.e.)}$$

Svar: $V = 4\pi\sqrt{3} \text{ v.e.}$

⑦ $\frac{2}{3} \int_1^{x^3} \frac{y(\sqrt{t})}{t} dt + (x^2+1)y = 4$ efter derivering

får vi begynnelsevärdesproblem:

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \frac{y(x)}{x^3} \cdot 3x^2 + 2xy + (x^2+1)y' = 0 \\ 2y(1) = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y' + \frac{2}{x}y = 0 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{x}y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{2}{x}dx, y \neq 0 \Rightarrow \ln|y| = -2\ln|x| + C$$

$$\Rightarrow y = Cx^{-2}; \quad y(1) = 2 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow y = \frac{2}{x^2} \text{ för } x > 0$$

Svar $y = \frac{2}{x^2}, x > 0.$