

Svar och kortfattade lösningar

*(Dessa lösningar kan användas för att kontrollera huruvida man har rätt svar.
De är dock inte säkert tillräckligt detaljerade för att ge full poäng på tentan.)*

Uppgift 1

1a: Starta med slackvariablerna i basen. Först blir x_2 inkommande och x_6 utgående. Sedan blir x_3 inkommande och x_4 utgående. Därefter fås optimum: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3/4$, ($x_4 = 0$, $x_5 = 7/2$, $x_6 = 0$) och $z = 13$. Lösning: Gör 2 st Ding 2 och 0.75 st Ding 3 per timme. Aktiva villkor är 1 och 3, dvs. all Stoff A går åt och man gör maximalt av Ding 1 + 2. Däremot är begränsningen för Verunreinigung B inte bindande.

1b: Läs av skuggpriserna ur optimaltablå: $y_1 = 1$, $y_2 = 0$, $y_3 = 4$. Detta betyder att vi tjänar 1 kr per timme om en enhet mer av Stoff A finns tillgängligt, och 4 kr per timme om vi får göra tre enheter av Ding 1 och 2, medan en ökning av den tillåtna mängden Verunreinigung B inte ger något.

1c: $x_5 = 3.5$ i optimallösningen, vilket är slacket i motsvarande bivillkor. Optimallösningen skulle alltså inte ändras om högerledet minskades med 3.5. Eftersom ursprungligt högerled är 3, kan det minska ner till noll. (En negativ övre gräns vore orimlig.) Mixomax kan alltså gå med på att den tillåtna mängden av förorening B minskas till noll.

1d: LP-dualen blir:

$$\begin{array}{ll} \min v = & 5y_1 + 3y_2 + 2y_3 \\ \text{då} & 3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 2 \\ & y_1 - y_2 + y_3 \geq 5 \\ & 4y_1 + 2y_2 \geq 4 \\ & y_1, \quad y_2, \quad y_3 \geq 0 \end{array}$$

Dual optimallösning är lika med skuggpriserna: $y_1 = 1$, $y_2 = 0$, $y_3 = 4$.

Komplementaritet: $x_2 > 0$, och duala bivillkor 2 är aktivt. $x_3 > 0$, och duala bivillkor 3 är aktivt. $y_1 > 0$, och primala bivillkor 1 är aktivt. $y_3 > 0$, och primala bivillkor 3 är aktivt.

1e: Endast bivillkor 2 är inaktivt, ta bort det, dvs. ta bort y_2 ur LP-dualen. Grafisk lösning visar att duala bivillkor 1 är tydligt redundant, dvs. inte blir aktivt för några värden på duala målfunktionskoefficienterna, dvs. de primala högerleden. Komplementaritet ger då att $x_1 = 0$ i primala optimallösningen.

1f: Enklast: Tillför $z_j = 24x_j$ och krävs att z_j är heltal, för $j = 1, 2, 3$. Man kan möjligtvis substituera bort x helt.

Dessutom: $x_2 \leq Mx_3$ där $M > 5$.

1g: P0: Första LP-opt: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3/4$ och $z = 13$, Detta ger $\bar{z} = 13$.

Förgrena över x_3 :

P2 ($x_3 \geq 1$): $x_3 = 1$. Grafisk lösning av problemet i x_1 och x_2 ger lösningen $x_1 = 0$ och $x_2 = 1$, med $z = 9$. Detta är heltal, så $\underline{z} = 9$. Kapa.

P1 ($x_3 \leq 0$): $x_3 = 0$. Grafisk lösning av problemet i x_1 och x_2 ger lösningen $x_1 = 0$ och $x_2 = 2$, med $z = 10$. Detta är heltal, så $\underline{z} = 10$. Kapa.

Alla grenar är avsökta, så optimum blir $x_1 = 0$, $x_2 = 2$ och $x_3 = 0$, med $z = 10$. Detta krav kostar alltså Mixomax 3 kr per timme.

Uppgift 2

2a: Det är ett billigaste uppspannande träd-problem som kan lösas med Kruskals (eller Prims) metod. Trädet blir (1,3), (1,4), (2,4), (4,6), (5,6), kostnad 18.

2b: Vi söker nu den billigaste vägen från brandstationsnoden till alla andra noder. Som tur är ger Dijkstras metod detta. (Det är en smaksak om man ersätter oriktade bågar med två motriktade bågar, eller beaktar båda riktningarna för varje båge i algoritmen.) Lösningen kallas billigaste vägträd.

Billigaste vägträdet från nod 4 är ganska ospännande, nämligen direktbågarna från nod 4 till varje annan nod. Summan av vägkostnaderna blir 21.

Billigaste vägträdet från nod 3 består av direktbågarna från nod 3 till nod 1, 4 och 6, samt vägen 3 - 4 - 2 till nod 2 och 3 - 4 - 5 (eller 3 - 6 - 5) till nod 5. Vägkostnaderna till resp. nod blir 3, 4, 6, 9 och 9, så summan av vägkostnaderna blir 31. Man förlorar alltså totalt 10 minuter på detta. (Observera skillnaden mot MST, de bågar som ingår i flera vägar räknas flera gånger.)

2c: Detta ger standardproblemet (okapaciterade) lokaliseringsproblemet, se kurslitteraturen, med αt_{ij} som transportkostnader.

2d: Nu blir det handelsresandeproblemet. Billigaste 1-träd blir bågarna (1,3), (1,4), (2,5), (3,4), (3,6), (5,6), med kostnaden 25. Detta ger alltid en undre gräns till det optimala målfunktionsvärdet. I detta fall fås inte en giltig tur. (Dock fås en ganska bra tur genom att byta ut (3,4) mot den aningen dyrare (2,4), vilket ger övre gränsen 26.)

2e: Bågfärgning. Antal färger är minst lika med maximal valens hos någon nod. Nod 4 har valens 5, så börja färga dessa bågar med 5 olika färger. Försök sedan färga resterande bågar med redan använda färger. (Vilket går bra.)

2f: Innehåller grafen en Eulercykel? Nej, ty flera noder har udda valens. Alla 6 noder har faktiskt udda valens, så för att lösa problemet lägger man till en billigaste perfekt matchning till dessa 6 noder, vilken består av 3 bågar. Så minst 3 bågar måste passeras mer än en gång.

Uppgift 3

3a: Alla bågar vars flöde inte ligger på undre eller övre gränsen måste vara basbågar, och dessa bågar ska ge ett uppspannande träd. I detta fall får man för många bågar,

så det är inte en baslösning. Observera speciellt cykeln 2 - 6 - 4. (En baslösning får aldrig innehålla en cykel.)

3b: Kör maxflödesmetoden. En flödesökande väg: 3 - 1 - 2 - 4 - 6, kapacitet 1. Skicka. (Samtliga bågar längs vägen blir därefter fulla, eller tomma. Många olika minsnitt bevisar då maxflöde.)

3c: Man kan inte använda simplexmetoden i nätverk, eftersom man inte har en baslösning. Cykeln som "förstör", 2 - 6 - 4, har dock en positiv kostnad, så genom att ta bort en enhets flöde i denna fås ett billigare flöde. Alltså, skicka en enhet vägen 2 - 4 - 6 - 2. Totalflödet från nod 3 till nod 5 är oförändrat och kostnaden har minskats med 4.