

När man optimerar för miljön dyker ofta olinjära samband upp.

Utsläpp av avgaser beror ofta på hastigheten, inte bara sträckan.

En motors utsläpp beror olinjärt på måtten/konstruktionen.

Negativa effekter av utsläpp från fabriker beror ofta på avståndet.

Därför måste vi titta lite på olinjär optimering.

Det lilla nystartade bryggeriet Frikeller ska designa en ny öl, med en blandning av Amarillo-humle och Citra-humle.

Låt x_1 stå för andelen Amarillo och x_2 andelen Citra.

Efter omfattande undersökningar kommer man fram till att smaken blir bäst om man minimerar följande funktion: $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - x_2$.

Bivillkor: $0 \leq x_1 \leq 1$, $0 \leq x_2 \leq 1$, och $x_1 + x_2 \leq 1$.

Optimalitetsvillkor

En viss punkt är *inte* optimal om vi **vill** och **får** gå till en annan punkt, dvs. om det finns någon punkt som är **bättre** (enligt målfunktionen) och **tillåten** (enligt bivillkoren).

En punkt är inte optimal om det finns en **tillåten förbättringsriktning**. (Lokalt kriterium.)

Gäller omvändningen?

Vi är närsynta! Vad händer utanför vårt synfält?

Vilka slutsatser kan man dra av lokala egenskaper?

Är lösningen lokalt optimal?

Är lösningen globalt optimal?

Matematisk notation

- 1 Se sida 55 i boken.
- 2 Inga vektorstreck. Vektorer: kolumnvektorer. Matriser versaler.
- 3 \forall : för alla.
- 4 Skalarprodukt: $c^T x = \sum_j c_j x_j$.
- 5 A medför B: $A \Rightarrow B$.
- 6 Element i S som inte är i T : $S \setminus T$.
- 7 Optimala värden på x : x^* .

Konvex funktion

Konvex funktion: "Glad mun." Snäll funktion för minimering. (rita)
Linjesegmentet mellan två punkter ligger ovanför funktionen.

Definition

En funktion $f(x)$ är **konvex** om
 $f(\lambda x^{(1)} + (1 - \lambda)x^{(2)}) \leq \lambda f(x^{(1)}) + (1 - \lambda)f(x^{(2)})$ för alla
 $x^{(1)}, x^{(2)}, 0 \leq \lambda \leq 1$.

Exempel: $f(x) = x_1^2$.

Exempel: $f(x) = 3x_1$.

Bivillkor definierade av en funktion: (rita)

Sats

Om $g(x)$ är en konvex funktion, så ger punkterna som uppfyller $g(x) \leq b$ en konvex mängd.

Exempel: $x_1^2 \leq 3$. $x_1^2 + x_2^2 \leq 17$.

Differentierbar konvex funktion

Egenvärden hos Hessianen: (jämför med andraderivator i endimensionella fallet)

Positivt semidefinit matris \Leftrightarrow egenvärden ≥ 0 .

Positivt definit matris \Leftrightarrow egenvärden > 0 .

Sats

Om $f(x)$ är en två gånger kontinuerligt differentierbar funktion, så är $f(x)$ konvex om dess hessian $H(x)$ är positivt semidefinit, och strikt konvex om $H(x)$ är positivt definit.

Beräkna egenvärden och kolla.

Metod med underdeterminanter:

Om varje ledande underdeterminant är positiv, är alla egenvärden positiva.

En "ledande underdeterminant", h_k , beräknas med de k första raderna och kolumnerna, dvs. alla kvadratiske delmatriser som börjar i övre vänstra hörnet.

Konvex funktion

Kombinera konvexa funktioner:

- $f_1(x) + f_2(x)$ är konvex om $f_1(x)$ och $f_2(x)$ är konvexa.
- $kf(x)$ är konvex om $f(x)$ är konvex och $k \geq 0$.

Tillsammans:

Sats

Om $f_i(x)$ är konvexa funktioner och $\alpha_i \geq 0$, så är $f(x) = \sum_i \alpha_i f_i(x)$ konvex.

Exempel: $f(x) = 2x_1^2 + 3x_2^2$.

Differentierbar konvex funktion

Exempel: $\min x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2$.

Gradienten är $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - 2x_2 \\ 4x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}$.

Hessianen är $H(x) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

Dess egenvärden är $3 - \sqrt{5} \approx 0.7639$ och $3 + \sqrt{5} \approx 5.2361$, båda positiva, så Hessianen är positivt definit, vilket visar att funktionen $f(x)$ är konvex.

Metod med underdeterminanter:

$h_1 = 2 > 0$.

$h_2 = 2 * 4 - (-2) * (-2) = 8 - 4 = 4 > 0$.

Så alla ledande underdeterminanter är positiva, vilket betyder att alla egenvärden är positiva, Hessianen är positivt definit, och funktionen $f(x)$ är konvex.

- Praktisk konvexitetskontroll av funktion:
 - ▶ Dela upp i konvexa bitar.
 - ▶ Använd satserna.
 - ▶ I värsta fall beräkna egenvärden.
- Kända konvexa funktioner:
 - ▶ $f(x) = a$ (konstant)
 - ▶ $f(x) = |x_j|$ (belopp)
 - ▶ $f(x) = x_j^2$ (kvadrat)
 - ▶ $f(x) = \sum_j a_{ij}x_j$ (linjär)
- Konvext problem (min): Konvex målfunktion, konvex tillåten mängd.
- Varför är detta intressant?

Ett lokalt optimum i ett konvext problem är alltid ett globalt optimum!

$$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - x_2$$

$$\text{då } x_1 + x_2 \leq 1 \text{ samt } 0 \leq x_1 \leq 1 \text{ och } 0 \leq x_2 \leq 1$$

Målfunktion: Summa av konvexa funktioner \Rightarrow Konvex.

Bivillkor: Alla linjära \Rightarrow Konvex tillåtet område.

\Rightarrow Problemet konvext.

Mot optimum

Flervariabelanalyskunskap:

Gradienten, $\nabla f(x)$, anger lutningen av funktionen $f(x)$.

Den pekar i den riktning där funktionen $f(x)$ ökar snabbast.

Vill man maximera $f(x)$ är $\nabla f(x)$ en bra riktning att gå i.

(Vill man minimera $f(x)$ är $-\nabla f(x)$ en bra riktning att gå i.)

Exempel: $\min x_1^2 + 2x_2^2$. Är punkten $\hat{x}_1 = 1, \hat{x}_2 = 1$ optimal?

Gradienten är $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}$, och i punkten $\nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Alltså kan vi gå i riktningen $d = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix}$ för att få bättre punkter.

Punkten $\hat{x}_1 = 1, \hat{x}_2 = 1$ är inte optimal, för det finns bättre punkter (i närheten).

Olinjär optimering utan bivillkor

$$\min f(x)$$

Gradienten $\nabla f(x)$ anger funktionens *lutning*.

Var ligger optimum?

$f(x)$ konvex, differentierbar: $\nabla f(\hat{x}) = 0 \Rightarrow \hat{x}$ är globalt minimum.

$f(x)$ ej konvex, men differentierbar: $\nabla f(\hat{x}) = 0 \Rightarrow$ Lutningen är noll. \hat{x} kan vara ett lokalt minimum, ett lokalt maximum eller en sadelpunkt.

Exempel: $\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2$. Gradienten är $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}$.

$\nabla f(x) = 0$ ger $x_1 = 0$ och $x_2 = 0$.

Eftersom $f(x)$ är konvex, är detta globalt minimum.

Exempel: $\min f(x) = -x_1^2 - 2x_2^2$. Gradienten är $\nabla f(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -4x_2 \end{pmatrix}$.

$\nabla f(x) = 0$ ger $x_1 = 0$ och $x_2 = 0$.

Men $f(x)$ är inte konvex. (Detta är faktiskt maximum.)

Olinjär optimering utan bivillkor

I en avtaganderiktning minskar funktionsvärdet.

I en ökanderiktning ökar funktionsvärdet.

En riktning d är en avtaganderiktning för $f(x)$ i x om $\nabla f(x)^T d < 0$.

En riktning d är en ökanderiktning för $f(x)$ i x om $\nabla f(x)^T d > 0$.

En ökanderiktning pekar in i samma halvrum som gradienten, en avtaganderiktning gör inte det.

Exempel: Är riktningen $d = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ en avtaganderiktning till funktionen

$f(x) = x_1^2 + 2x_2^2$ i punkten $\hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$?

$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}$. $\nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \end{pmatrix}$. Så $\nabla f(\hat{x})^T d = 4 - 12 = -8 < 0$.

Ja, det är en avtaganderiktning.

Olinjär optimering med bivillkor

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{då} & g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, m \end{array}$$

Var ligger optimum?

Inga aktiva bivillkor: Som utan bivillkor. $\nabla f(x) = 0$.

Ett eller flera aktiva bivillkor: Det får inte finnas någon tillåten förbättringsriktning.

$-\nabla f(x)$ är den mest önskade riktningen (brantaste lutningen).

Alla riktningar d med $\nabla f(x)^T d < 0$ är avtaganderiktningar.

Om bivillkoret $g_i(x) \leq 0$ är aktivt, får $g_i(x)$ inte öka.

$\nabla g_i(x)$ är då den mest förbjudna riktningen (utåtriktade normalen).

Alla riktningar d med $\nabla g_i(x)^T d > 0$ är förbjudna.

Så hur vet man om alla avtaganderiktningar är förbjudna?

Exempel

Exempel: $\min x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 - x_1 - x_2$ då $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_2 \leq 0.4$.

Skriv bivillkoren som $g_1(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$, $g_2(x) = x_2 - 0.4 \leq 0$.

Gradienter:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 - 1 \\ -x_1 + 2x_2 - 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Är $\hat{x}_1 = 0.6$, $\hat{x}_2 = 0.4$ optimal?

Är punkten tillåten? Kolla:

$g_1(\hat{x}) = 0$. Tillåtet. Bivillkoret aktivt.


$g_2(\hat{x}) = 0$. Tillåtet. Bivillkoret aktivt.

Punkten är tillåten. Båda bivillkoren aktiva.

$$\nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} -0.2 \\ -0.8 \end{pmatrix}$$

Rita!

Exempel



Nej, förbättringsriktningarna täcks helt av de förbjudna riktningarna.

Olinjär optimering med bivillkor: Optimalitetsvillkor

Problemet:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{då} \quad & g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Karush-Kuhn-Tuckervillkoren:

Punkten \hat{x} är en KKT-punkt om följande är uppfyllt.

KKT1: $g_i(\hat{x}) \leq 0$ för alla i .

KKT2: $u_i g_i(\hat{x}) = 0$ för alla i .

KKT3: $\nabla f(\hat{x}) + \sum_{i=1}^m u_i \nabla g_i(\hat{x}) = 0$.

KKT4: $u_i \geq 0$ för alla i .

En KKT-punkt är optimal om problemet är konvext.

Vad är detta???

Olinjär optimering med bivillkor: Optimalitetsvillkor

Analys av KKT-villkoren för problemet:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{då} \quad & g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Vi ska kontrollera om punkten \hat{x} är en KKT-punkt.

KKT1: $g_i(\hat{x}) \leq 0$ för alla i .

Först kontrollerar vi om punkten är tillåten.

KKT2: $u_i g_i(\hat{x}) = 0$ för alla i .

Vi ska göra en projektion av målfunktionen på de **aktiva** bivillkoren.

För att bara få med de aktiva bivillkoren, ser vi till att $u_i = 0$ för alla icke aktiva bivillkor, dvs. de som har $g_i(\hat{x}) < 0$.

(I två dimensioner kan man se detta grafiskt.)

Olinjär optimering med bivillkor: Optimalitetsvillkor

Analys av KKT-villkoren för problemet:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) \\ \text{då} \quad & g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Vi har gjort KKT1 och KKT2, så vi vet att punkten är tillåten, och har sett till att $u_i = 0$ för alla icke aktiva bivillkor.

Nu är det dags att göra projektionen.

KKT3: $\nabla f(\hat{x}) + \sum_{i=1}^m u_i \nabla g_i(\hat{x}) = 0$.

som är samma som $-\nabla f(\hat{x}) = \sum_i u_i \nabla g_i(\hat{x})$.

Observera att $-\nabla f(\hat{x})$ är vår önskeriktning, medan $\nabla g_i(\hat{x})$ är utåtriktade normaler till bivillkoren, dvs. de mest förbjudna riktningarna.

Vi skriver önskeriktningen som en kombination av förbjudna riktningar.

Olinjär optimering med bivillkor: Optimalitetsvillkor

Vi har gjort projektionen $-\nabla f(\hat{x}) = \sum_i u_i \nabla g_i(\hat{x})$.

Påstående: Om $u_i \geq 0$ för alla i , så är alla förbättringsriktningar otillåtna.

Multiplitera med en valfri riktning d : $-\nabla f(\hat{x})^T d = \sum_i u_i \nabla g_i(\hat{x})^T d$.

Om d är en **tillåten riktning**, så är $\nabla g_i(\hat{x})^T d \leq 0$ för alla i .

Om $u_i \geq 0$ för alla i , så blir $\sum_i u_i \nabla g_i(\hat{x})^T d \leq 0$,

vilket betyder att $-\nabla f(\hat{x})^T d \leq 0$, dvs. $\nabla f(\hat{x})^T d \geq 0$, vilket visar att d **inte är en avtaganderiktning**.

Å andra sidan, om något $u_i < 0$, så gäller inte detta.

Detta visar behovet av: **KKT4:** $u_i \geq 0$ för alla i .

Vi vet nu att KKT4 tillsammans med KKT3, KKT2 och KKT1 bevisar att ingen tillåten förbättringsriktning finns i punkten \hat{x} , så \hat{x} kan vara optimal.

En sådan punkt kallas KKT-punkt.

För att en KKT-punkt säkert ska vara optimal, krävs **konvexitet**.

Annars kan det vara ett lokalt optimum eller en sadelpunkt (eller någon annan konstig punkt).

Detta är ett sätt att kontrollera om en viss *given* punkt är optimal.

Då är nämligen alla gradienter givna, och bara u behöver lösas ut.

Detta kan göras eftersom KKT3 då ger ett *linjärt* ekvationssystem.

$$\begin{aligned} \min & f(x) \\ \text{då} & g_i(x) \leq 0 \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Karush-Kuhn-Tuckervillkoren:

Punkten \hat{x} är en KKT-punkt om följande är uppfyllt.

KKT1: $g_i(\hat{x}) \leq 0$ för alla i . (Tillåtenhet)

KKT2: $u_i g_i(\hat{x}) = 0$ för alla i . (Plocka bort inaktiva bivillkor)

KKT3: $\nabla f(\hat{x}) + \sum_{i=1}^m u_i \nabla g_i(\hat{x}) = 0$. (Projektion)

KKT4: $u_i \geq 0$ för alla i . (Kolla riktning)

KKT3 är ett linjärt ekvationssystem i u som kan lösas metodiskt.

Tolkning av KKT-villkoren

KKT1 tar bort otillåtna punkter.

KKT2 tar bort inaktiva bivillkor.

KKT3 projicerar önskeriktningen $-\nabla f(x)$ på aktiva bivillkors normaler $\nabla g_i(x)$.

KKT4 kontrollerar att **önskeriktningen $-\nabla f(x)$ ligger i konen som spänns upp av aktiva bivillkors normaler $\nabla g_i(x)$** ,

dvs. att alla förbättringsriktningar är otillåtna.

Hur gör man med likhetsbivillkor?

De är alltid aktiva, och $u_i < 0$ är tillåtet, så KKT2 och KKT4 faller bort för dessa bivillkor.

Vårt tidigare exempel

$$\min x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 - x_1 - x_2 \quad \text{då } x_1 + x_2 \leq 1, x_2 \leq 0.4.$$

Är $\hat{x}_1 = 0.6, \hat{x}_2 = 0.4$ optimal?

$$\nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} -0.2 \\ -0.8 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

KKT1: Är punkten tillåten?

$g_1(\hat{x}) = 0$. Tillåtet. Bivillkoret aktivt. KKT2: u_1 behöver inte vara noll.

$g_2(\hat{x}) = 0$. Tillåtet. Bivillkoret aktivt. KKT2: u_2 behöver inte vara noll.

Punkten är tillåten. KKT2: Inget av u_1 eller u_2 måste vara noll.


$$\text{KKT3: } \begin{pmatrix} -0.2 \\ -0.8 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dvs. $u_1 = 0.2, u_1 + u_2 = 0.8$, vilket ger $u_1 = 0.2, u_2 = 0.6$.

KKT4 uppfyllt, $u_1 \geq 0$ och $u_2 \geq 0$.


Punkten är optimal, ty den är en KKT-punkt och problemet är konvext.

Grafisk tolkning av KKT-villkoren



En tillåten förbättringsriktning finns.

Grafisk tolkning av KKT-villkoren



Slutsats: Om $-\nabla f(x)$ ligger i konen av $\nabla g_i(x)$ är det optimum.

KKT-villkoren och optimalitet

En KKT-punkt kan vara optimum.

Om problemet är *konvext*, så är en KKT-punkt ett *globalt optimum*.

Om problemet inte är konvext kan det finnas KKT-punkter som inte är optimala. Vissa KKT-punkter kan vara lokala optima.

Det finns vissa krav, kallade CQ (Constraint Qualification), för att optimum ska vara en KKT-punkt, bl.a.:

- Linjärt oberoende normaler för aktiva bivillkor.
- Konvext tillåtet område med inre punkt.

Om inget CQ är uppfyllt, kanske det inte finns någon KKT-punkt. (CQ kan i denna kurs antas vara uppfyllda.)

Om något CQ är uppfyllt, och problemet är konvext, är alltså optimum och bara optimum är en KKT-punkt.

KKT-villkoren: Exempel

Exempel: min $f(x) = x_1^2 + 2x_2^2$ då $g(x) = x_1 + x_2 + 1 \leq 0$.

Är $\hat{x}_1 = -0.5$ och $\hat{x}_2 = -0.5$ optimal?

KKT1: Punkten är tillåten.

KKT2: Bivillkoret är aktivt. (Så u behöver inte vara 0.)

KKT3: $\nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$, och $\nabla g(\hat{x}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

KKT3 blir $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

vilket betyder $u = 1$ och $u = 2$. Ej lösbart.

\hat{x} är alltså ingen KKT-punkt.

KKT-villkoren: Exempel

Exempel: min $x_1^2 + 2x_2^2$ då $x_1 + x_2 \geq 1$, $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$.

Skriv bivillkoren som

$$g_1(x) = -x_1 - x_2 + 1 \leq 0, \quad g_2(x) = -x_1 \leq 0, \quad g_3(x) = -x_2 \leq 0.$$

$$\text{Gradienter: } \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_1(x) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \nabla g_2(x) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\nabla g_3(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{KKT3: } \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + u_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sätt in de punkter som ska testas.

KKT-villkoren: Exempel

Är $\hat{x}_1 = 1$ och $\hat{x}_2 = 0$ optimal?

KKT1: Punkten är tillåten.

KKT2: $g_1(\hat{x}) = 0$. (u_1 behöver inte vara 0.)

KKT2: $g_2(\hat{x}) = -1 < 0$. ($u_2 = 0$.)

KKT2: $g_3(\hat{x}) = 0$. (u_3 behöver inte vara 0.)

$$\text{KKT3: } \nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{KKT3 blir } \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + u_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dvs. $2 - u_1 = 0$, $-u_1 - u_3 = 0$, vilket har lösningen $u_1 = 2$ och $u_3 = -2$.

\hat{x} är ingen KKT-punkt, ty $u_3 < 0$.

KKT-villkoren: Exempel

Är $\hat{x}_1 = 0$ och $\hat{x}_2 = 1$ optimal?

KKT1: Punkten är tillåten.

KKT2: $g_1(\hat{x}) = 0$. (u_1 behöver inte vara 0.)

KKT2: $g_2(\hat{x}) = 0$. (u_2 behöver inte vara 0.)

KKT2: $g_3(\hat{x}) = -1 < 0$. ($u_3 = 0$.)

$$\text{KKT3: } \nabla f(\hat{x}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{KKT3 blir } \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dvs. $-u_1 - u_2 = 0$, $4 - u_1 = 0$, vilket har lösningen $u_1 = 4$ och $u_2 = -4$.

\hat{x} är ingen KKT-punkt, ty $u_2 < 0$.

KKT-villkoren: Exempel

Istället för att ange en punkt kan man anta vilka bivillkor som är aktiva.
(Detta fungerar bara ibland.)

Antag att $x_1 + x_2 = 1$ är aktivt och att $x_1 > 0$ och $x_2 > 0$.

Dvs. $g_1(\hat{x}) = 0$, $g_2(\hat{x}) < 0$ och $g_3(\hat{x}) < 0$.

KKT2 ger då $u_2 = 0$ och $u_3 = 0$.

$$\text{KKT3 blir då } \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

vilket betyder $2x_1 - u_1 = 0$ och $4x_2 - u_1 = 0$.

Lös ut x i u : $x_1 = u_1/2$ och $x_2 = u_1/4$.

Antagandet $x_1 + x_2 = 1$ ger då $x_1 + x_2 = u_1/2 + u_1/4 = 1$,

vilket ger $u_1 = 4/3$, och $x_1 = 2/3$ och $x_2 = 1/3$.

Detta en KKT-punkt, ty $u_1 > 0$, och globalt optimum, ty problemet är konvext.

Frikeller-exempel

$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - x_2$ då $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 0$ och $x_2 \geq 0$.

(Bivillkoren $x_1 \leq 1$ och $x_2 \leq 1$ redundanta. Ta bort.)

Konvext.

Är det optimalt att bara använda en sort?

Kolla punkterna (1,0) och (0,1).

Först $\hat{x} = (1, 0)$:

KKT1: Punkten är tillåten.

KKT2: Bivillkor 1 och 3 aktiva, bivillkor 2 inte. $\Rightarrow u_2 = 0$.

$$\text{KKT3: } \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dvs. $u_1 = 0$, $u_1 - u_3 = 1$, vilket har lösningen $u_1 = 0$ och $u_3 = -1$.

\hat{x} är ingen KKT-punkt, ty $u_3 < 0$.

Frikeller-exempel

$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - x_2$ då $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 0$ och $x_2 \geq 0$.

Nu $\hat{x} = (0, 1)$:

KKT1: Punkten är tillåten.

KKT2: Bivillkor 1 och 2 aktiva, bivillkor 3 inte. $\Rightarrow u_3 = 0$.

$$\text{KKT3: } \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dvs. $u_1 - u_2 = 2$, $u_1 = -3$, vilket har lösningen $u_1 = -3$ och $u_2 = -5$.

\hat{x} är ingen KKT-punkt, ty $u_1 < 0$ och $u_2 < 0$.

Frikeller-exempel

$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1 - x_2$ då $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 \geq 0$ och $x_2 \geq 0$.

Antag istället att $0 < x_1 < 1$, $0 < x_2 < 1$ och $x_1 + x_2 = 1$.

KKT2: Bivillkor 1 aktivt, bivillkor 2 och 3 inte. $\Rightarrow u_2 = 0$, $u_3 = 0$.

$$\text{KKT3: } \begin{pmatrix} 2x_1 - 2 \\ 4x_2 - 1 \end{pmatrix} + u_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dvs. $2x_1 + u_1 = 2$, $4x_2 + u_1 = 1$, vilket ger $x_1 = (2 - u_1)/2$ och $x_2 = (1 - u_1)/4$.

KKT1: $x_1 + x_2 = 1$ ger $(2 - u_1)/2 + (1 - u_1)/4 = 1$, vilket ger $u_1 = 1/3$.

Det ger $x_1 = 5/6$ och $x_2 = 1/6$.

$x_1 \geq 0$ och $x_2 \geq 0$ så KKT1 är uppfyllt.

Detta är en KKT-punkt.

Optimum, ty problemet konvext.

Svar: Använd proportionerna 5/6 Amarillo och 1/6 Citra.