

# Dagens ämnen

# Dagens ämnen

- Rotationsarea

# Dagens ämnen

- Rotationsarea
- Pappos-Guldins regler

# Dagens ämnen

- Rotationsarea
- Pappos-Guldins regler
- Tyngdpunkt

# Rotationsarea

# Rotationsarea

- Roterat ett litet kurvsegment

# Rotationsarea

- Roterar ett litet kurvsegment
- Bli ungefär ett smalt band i form av en stympad kon

# Rotationsarea

- Roterar ett litet kurvsegment
- Blir ungefär ett smalt band i form av en stympad kon med basradien  $l$  = avståndet från  $ds$ -segmentet till rotationsaxeln



# Rotationsarea

- Roterar ett litet kurvsegment
- Blir ungefär ett smalt band i form av en stympad kon med basradien  $l$  = avståndet från  $ds$ -segmentet till rotationsaxeln
- Klipp upp!


# Rotationsarea

- Roterar ett litet kurvsegment
- Blir ungefär ett smalt band i form av en stympad kon med basradien  $l$  = avståndet från  $ds$ -segmentet till rotationsaxeln
- Klipp upp! Arean blir ungefär samma som en rektangel med  
långsida =  $2\pi \cdot l$  och kortsida =  $ds$ .
- Följaktligen får vi

$$dA = 2\pi l ds$$

# Area av det uppklippta bandet


$\Delta A \approx$  areaskillnaden mellan två cirkelsektorer med öppningsvinkel  $\alpha$  och radie  $R$  respektive  $R + \Delta s$ .



# Area av det uppklippta bandet

$\Delta A \approx$  areaskillnaden mellan två cirkelsektorer med öppningsvinkel  $\alpha$  och radie  $R$  respektive  $R + \Delta s$ .


$$\Delta A \approx \pi(R + \Delta s)^2 \frac{\alpha}{2\pi} - \pi R^2 \frac{\alpha}{2\pi}$$



# Area av det uppklippta bandet


$\Delta A \approx$  areaskillnaden mellan två cirkelsektorer med öppningsvinkel  $\alpha$  och radie  $R$  respektive  $R + \Delta s$ .

$$\begin{aligned}\Delta A &\approx \pi(R + \Delta s)^2 \frac{\alpha}{2\pi} - \pi R^2 \frac{\alpha}{2\pi} = \\ &= \frac{\alpha}{2}(2R\Delta s + (\Delta s)^2)\end{aligned}$$



# Area av det uppklippta bandet


$\Delta A \approx$  areaskillnaden mellan två cirkelsektorer med öppningsvinkel  $\alpha$  och radie  $R$  respektive  $R + \Delta s$ .



$$\begin{aligned}\Delta A &\approx \pi(R + \Delta s)^2 \frac{\alpha}{2\pi} - \pi R^2 \frac{\alpha}{2\pi} = \\ &= \frac{\alpha}{2}(2R\Delta s + (\Delta s)^2) = \\ &= \alpha R\Delta s + \frac{\alpha}{2}(\Delta s)^2\end{aligned}$$


# Area av det uppklippta bandet

$\Delta A \approx$  areaskillnaden mellan två cirkelsektorer med öppningsvinkel  $\alpha$  och radie  $R$  respektive  $R + \Delta s$ .



$$\begin{aligned}\Delta A &\approx \pi(R + \Delta s)^2 \frac{\alpha}{2\pi} - \pi R^2 \frac{\alpha}{2\pi} = \\ &= \frac{\alpha}{2}(2R\Delta s + (\Delta s)^2) = \\ &= \alpha R\Delta s + \frac{\alpha}{2}(\Delta s)^2 \approx \\ &\approx \alpha R\Delta s\end{aligned}$$

# Area av det uppklippta bandet



$\Delta A \approx$  areaskillnaden mellan två cirkelsektorer med öppningsvinkel  $\alpha$  och radie  $R$  respektive  $R + \Delta s$ .

$$\begin{aligned}\Delta A &\approx \pi(R + \Delta s)^2 \frac{\alpha}{2\pi} - \pi R^2 \frac{\alpha}{2\pi} = \\ &= \frac{\alpha}{2}(2R\Delta s + (\Delta s)^2) = \\ &= \alpha R\Delta s + \frac{\alpha}{2}(\Delta s)^2 \approx \\ &\approx \alpha R\Delta s = 2\pi l ds\end{aligned}$$



# Rotationsarea

# Rotationsarea

Rotation kring  $x$ -axeln ( $l = y$ )

# Rotationsarea

Rotation kring  $x$ -axeln ( $l = y$ )

- Kurva på parameterform

$$dA = 2\pi l ds = 2\pi y \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

# Rotationsarea

Rotation kring  $x$ -axeln ( $l = y$ )

- Kurva på parameterform

$$dA = 2\pi l ds = 2\pi y \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

- Funktionskurva

$$dA = 2\pi l ds = 2\pi y \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

# Pappos-Guldins regler

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel =  $2\pi \cdot$  TP:s avstånd till rotationsaxeln.



# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel =  $2\pi \cdot$  TP:s avstånd till rotationsaxeln.
- Volymen = TP:s väg  $\cdot$  arean av området som roteras

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel =  $2\pi \cdot$  TP:s avstånd till rotationsaxeln.
- Volymen = TP:s väg  $\cdot$  arean av området som roteras
- Arean = TP:s väg  $\cdot$  längden av kurvan som roteras

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel =  $2\pi \cdot$  TP:s avstånd till rotationsaxeln.
- Volymen = TP:s väg  $\cdot$  arean av området som roteras
- Arean = TP:s väg  $\cdot$  längden av kurvan som roteras
- Användning

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel =  $2\pi \cdot$  TP:s avstånd till rotationsaxeln.
- Volymen = TP:s väg  $\cdot$  arean av området som roteras
- Arean = TP:s väg  $\cdot$  längden av kurvan som roteras
- Användning
  - Rotationsvolym:  $dV = \text{TP:s väg} \cdot dA$

# Pappos-Guldins regler

- Tyngdpunktens (TP) väg är ett bra samlingsmått vid beräkning av rotationsareor och volymer
- TP:s väg = omkrets av cirkel =  $2\pi \cdot$  TP:s avstånd till rotationsaxeln.
- Volymen = TP:s väg  $\cdot$  arean av området som roteras
- Arean = TP:s väg  $\cdot$  längden av kurvan som roteras
- Användning
  - Rotationsvolym:  $dV = \text{TP:s väg} \cdot dA$
  - Rotationsarea:  $dA = \text{TP:s väg} \cdot ds$

# Tyngdpunkt

# Tyngdpunkt

- Tänk jämvikt

# Tyngdpunkt

- Tänk jämvikt
- Totala vridmomentet = 0



# Tyngdpunkt

- Tänk jämvikt
- Totala vridmomentet = 0
- Ändligt många punktmassor längs en linje

# Tyngdpunkt

- Tänk jämvikt
- Totala vridmomentet = 0
- Ändligt många punktmassor längs en linje

$$\sum_{i=1}^n (x_i - x_t) m_i = 0 \iff$$

# Tyngdpunkt

- Tänk jämvikt
- Totala vridmomentet = 0
- Ändligt många punktmassor längs en linje

$$\sum_{i=1}^n (x_i - x_t) m_i = 0 \iff x_t \sum_{i=1}^n m_i = \sum_{i=1}^n x_i m_i$$

# Tyngdpunkt

- Tänk jämvikt
- Totala vridmomentet = 0
- Ändligt många punktmassor längs en linje

$$\sum_{i=1}^n (x_i - x_t)m_i = 0 \iff x_t \sum_{i=1}^n m_i = \sum_{i=1}^n x_i m_i$$

$$x_t = \frac{1}{\sum_{i=1}^n m_i} \sum_{i=1}^n x_i m_i$$

# Tyngdpunkt

# Tyngdpunkt

- Stycka upp i småbitar och använd integrationsidén

# Tyngdpunkt

- Stycka upp i småbitar och använd integrationsidén
- $m$  = områdets totala massa

# Tyngdpunkt

- Stycka upp i småbitar och använd integrationsidén
- $m$  =områdets totala massa
- OBS!  $x = x$ -värdet för  $dm$ :s tyngdpunkt



# Tyngdpunkt

- Stycka upp i småbitar och använd integrationsidén
- $m$  =områdets totala massa
- OBS!  $x = x$ -värdet för  $dm$ :s tyngdpunkt

$$x_t = \frac{1}{m} \int x dm$$

# Tyngdpunkt

- Stycka upp i småbitar och använd integrationsidén
- $m$  =områdets totala massa
- OBS!  $x = x$ -värdet för  $dm$ :s tyngdpunkt

$$x_t = \frac{1}{m} \int x dm$$

- OBS!  $y = y$ -värdet för  $dm$ :s tyngdpunkt

# Tyngdpunkt

- Stycka upp i småbitar och använd integrationsidén
- $m$  =områdets totala massa
- OBS!  $x = x$ -värdet för  $dm$ :s tyngdpunkt

$$x_t = \frac{1}{m} \int x dm$$

- OBS!  $y = y$ -värdet för  $dm$ :s tyngdpunkt

$$y_t = \frac{1}{m} \int y dm$$