

## Lösningsskisser till TATA69 Flervariabelanalys 2023-10-26

1. (a) Med

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y^4}{x^2 + y^2}$$

får vi

$$f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1 \rightarrow 1 \text{ då } x \rightarrow 0,$$

$$f(0, y) = \frac{y^4}{y^2} = y^2 \rightarrow 0 \text{ då } y \rightarrow 0.$$

Eftersom vi fick olika värden längs två olika kurvor som går in mot punkten existerar inte gränsvärdet.

**Svar:** Existerar ej.

(b) Vi kan börja notera att  $f(x, y) = x + 2x^2 - y^3$  uppfyller  $f(1, -1) = 1 + 2 \cdot 1^2 - (-1)^3 = 4$ , så grafen går genom punkten  $(1, -1, 4)$ . Vi har nu  $\nabla f(x, y) = (1 + 4x, -3y^2)$  så  $\nabla f(1, -1) = (5, -3)$ . Detta ger

$$f'_v(1, -1) = \frac{\nabla f(1, -1) \cdot \bar{v}}{|\bar{v}|} = \frac{(5, -3) \cdot (2, 1)}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{10 - 3}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}}.$$

Formeln för tangentplanet till en graf  $z = f(x, y)$  i punkten  $(a, b, f(a, b))$  ges av

$$z = f(a, b) + f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b),$$

vilket med vårt  $f$  och  $(a, b) = (1, -1)$  ger

$$z = 4 + 5(x - 1) - 3(y + 1).$$

**Svar:** Riktningderivata:  $f'_v(1, -1) = 7/\sqrt{5}$ , tangentplan:  $z = 4 + 5(x - 1) - 3(y + 1)$ .

2. (a) Med

$$\begin{cases} u &= x + 3y, \\ v &= y \end{cases}$$

får vi

$$\begin{cases} z'_x &= z'_u u'_x + z'_v v'_x = z'_u \\ z'_y &= z'_u u'_y + z'_v v'_y = 3z'_u + z'_v. \end{cases}$$

Så

$$3z'_x - z'_y = 3z'_u - (3z'_u + z'_v) = -z'_v = 0,$$

dvs.

$$z'_v = 0 \Leftrightarrow z = f(u) = f(x + 3y) \text{ där } f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}).$$

**Svar:**  $z = f(x + 3y)$ ,  $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ .

(b)

$$z''_{xx} = 1 \Leftrightarrow z'_x = x + f(y) \Leftrightarrow z = \frac{x^2}{2} + xf(y) + g(y), \quad f, g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}).$$

**Svar:**  $z = x^2/2 + xf(y) + g(y)$ ,  $f, g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ .

3. (a) Eftersom  $f'_x(0,0) = 1 \neq 0$  är punkten inte stationär, och alltså ingen extrempunkt.

**Svar:** Ej extrempunkt.

- (b)  $\nabla f(0,0) = (0,0)$  så punkten är stationär. Dessutom gäller att  $f(x,y) = 1 + Q(x,y) + \mathcal{O}(|(x,y)|^3)$  där

$$Q(x,y) = 2x^2 + xy + y^2 = 2(x + y/4)^2 - y^2/8 + y^2 = 2(x + y/4)^2 + 7y^2/8$$

som är positivt definit (dvs.  $> 0$  för  $(x,y) \neq (0,0)$ ). Alltså är  $(0,0)$  ett lokalt minimum till  $f$ .

**Svar:** Lokalt minimum.

- (c) Vi har

$$\nabla f(x,y) = (2x - 3x^2 + 3x^2y, 8 - 8y + x^3); \quad \nabla f(0,1) = (0,0),$$

så  $(0,1)$  är en stationär punkt. Vidare gäller

$$\begin{aligned} f''_{xx}(x,y) &= 2 - 6x + 6xy; & f''_{xx}(0,1) &= 2, \\ f''_{xy}(x,y) &= 3x^2; & f''_{xy}(0,1) &= 0, \\ f''_{yy}(x,y) &= -8; & f''_{yy}(0,1) &= -8. \end{aligned}$$

Den kvadratiske formen

$$Q(h,k) = f''_{xx}(0,1)h^2 + 2f''_{xy}(0,1)hk + f''_{yy}(0,1)k^2 = 2h^2 - 8k^2$$

är indefinit (t.ex. är  $Q(1,0) = 2 > 0$  och  $Q(0,1) = -8 < 0$ ), så  $(0,1)$  är en sadelpunkt till  $f$ , dvs. ingen lokal extrempunkt.

(Man kan även lösa uppgiften mer som i (b) genom att räkna ut


$$\begin{aligned} f(h,1+k) &= -6 + 8(1+k) + h^2 - 4(1+k) - h^3 + h^3(1+k) \\ &= -2 + h^2 - 4k^2 + h^3k = -2 + (h^2 - 4k^2) + \mathcal{O}(|(h,k)|^3), \end{aligned}$$

och eftersom det inte finns med några förstgradstermer är gradienten noll i punkten, och den kvadratiske formen  $h^2 - 4k^2$  (vilket är  $Q(h,k)/2$  där  $Q$  är som ovan) är indefinit, så därför är det en sadelpunkt.)

**Svar:** Ej extrempunkt (sadelpunkt).

4. Övergång till polära koordinater  $(\rho, \varphi)$  ger

$$\begin{aligned} \iint_D (x+2y) dx dy &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left( \int_0^3 (\rho \cos \varphi + 2\rho \sin \varphi) \rho d\rho \right) d\varphi \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left[ \frac{\rho^3}{3} (\cos \varphi + 2 \sin \varphi) \right]_{\rho=0}^3 d\varphi = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} 9(\cos \varphi + 2 \sin \varphi) d\varphi \\ &= 9 [\sin \varphi - 2 \cos \varphi]_{-\pi/4}^{\pi/4} = 9\sqrt{2}. \end{aligned}$$



**Svar:**  $9\sqrt{2}$ .

5. Eftersom  $0 < x^3 < x^2 \Leftrightarrow 0 < x < 1$  ser vi att  $D$  ges av olikheterna

$$0 < x < 1, \quad x^3 < y < x^2, \quad 4 < z < \infty.$$

Vi noterar nu att integralen är generaliserad både på grund av att området är obegränsat i  $z$ -led och att integranden är obegränsad i varje omgivning till  $x = 0$ . Men integranden är positiv så vi kan tillämpa Fubinis sats direkt:

$$\begin{aligned} \iiint_D \frac{1}{x^2 z^2} dx dy dz &= \int_4^\infty \left( \int_0^1 \left( \int_{x^3}^{x^2} \frac{1}{x^2 z^2} dy \right) dx \right) dz \\ &= \int_4^\infty \left( \int_0^1 \frac{x^2 - x^3}{x^2} \frac{1}{z^2} dx \right) dz = \left[ x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \cdot \int_4^\infty \frac{1}{z^2} dz \\ &= \frac{1}{2} \cdot \lim_{T \rightarrow \infty} \left[ -\frac{1}{z} \right]_4^T = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

(Alternativt kan man jobba med en uttömmande följd, t ex

$$D_n = \{(x, y, z) : 1/n < x < 1, x^3 < y < x^2, 4 < z < n\}$$

och får då

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iiint_{D_n} \frac{1}{x^2 z^2} dx dy dz = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} \right) \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{8}.$$

**Svar:**  $1/8$ .

6. För en given punkt

$$P = P(s, t) = (x, y, z) = (st^2 - s - 4t, s - t^2, s^2 + 4t) \text{ där } -1 < s < 1, -1 < t < 1$$

är vektorerna

$$(x'_s, y'_s, z'_s) = (t^2 - 1, 1, 2s) \text{ och } (x'_t, y'_t, z'_t) = (2st - 4, -2t, 4)$$

parallella med tangentplanet till ytan i  $P$ . Så om planet  $x + 2y + z = d$  ska tangera ytan i  $P$  måste normalvektorn  $(1, 2, 1)$  till planet vara ortogonal mot båda dessa vektorer, och vice versa om den är ortogonal mot båda dessa och vi väljer  $d$  så att  $x + 2y + z = d$  går genom  $P$ , då är detta tangentplanet till ytan i  $P$ . Alltså får vi ekvationssystemet:

$$\begin{cases} (1, 2, 1) \bullet (t^2 - 1, 1, 2s) = t^2 - 1 + 2 + 2s = 0 \\ (1, 2, 1) \bullet (2st - 4, -2t, 4) = 2st - 4 - 4t + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t^2 + 2s = -1 \\ 2st - 4t = 0. \end{cases}$$

Ekvationen  $2st - 4t = 0$  har lösningarna  $s = 2$  och  $t = 0$ , där den första ligger utanför intervallet  $-1 < s < 1$ . Med  $t = 0$  insatt i  $t^2 + 2s = -1$  får vi  $s = -1/2$  (om vi hade satt in  $s = 2$  här hade vi inte fått någon reell lösning för  $t$  heller). Alltså

finns det bara en punkt  $(s, t) = (-1/2, 0)$  som ger ett  $P(s, t)$  ovan som uppfyller kraven, och denna punkt blir då

$$P = (1/2, -1/2, 1/4).$$

För att bestämma  $d$  sätter vi in denna punkt i ekvationen

$$1/2 + 2(-1/2) + 1/4 = -1/4 = d.$$

**Svar:** Det enda  $d$  som ger ett plan  $x + 2y + z = d$  som tangerar den givna ytan är  $d = -1/4$ , och planet tangerar då i punkten  $(1/2, -1/2, 1/4)$  (som ges av  $(s, t) = (-1/2, 0)$ ).