

26.1)

a) $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$

$$\text{grad } f = \nabla f = (f'_x, f'_y, f'_z) = (1, 2, 3)$$

b)

$$f(x, y) = xy^2e^{-xy}$$


$$\begin{aligned}\text{grad } f = \nabla f &= (f'_x, f'_y) = (y^2e^{-xy} - xy^3e^{-xy}, 2xye^{-xy} - x^2y^2e^{-xy}) = \\ &= ((y^2 - xy^3)e^{-xy}, (2xy - x^2y^2)e^{-xy}).\end{aligned}$$

2 6.2) $f(x, y) = x^2 + 4y = c \Leftrightarrow y = \frac{c}{4} - \frac{x^2}{4}$.

$\nabla f = (2x, 4)$ $\nabla f(0, 8) = (0, 4)$

$\nabla f(2, 3) = (4, 4)$ $\nabla f(4, -4) = (8, 4)$

$\nabla f(6, -5) = (12, 4)$ $\nabla f(8, -8) = (16, 4)$.



Längre gradient $\Rightarrow$ tätare nivåkurvor.

6.3) $f(x,y) = x^3 + xy + y^3 = 5$

$$\nabla f = (f'_x, f'_y) = (3x^2 + y, x + 3y^2)$$

$$\nabla f(2,-1) = (11, 5)$$

(OBS! $f(2,-1) = 5$, så $(2,-1)$ ligger på kurvan).

∇f pekar i normalriktning till nivåkurvan så


$$(11, 5) \cdot (x-2, y+1) = 0 \Leftrightarrow \underline{\underline{11x + 5y = 17}} \text{ ger tangentlinjen}$$

$$(5, -11) \cdot (11, 5) = 0 \text{ så}$$

$$(5, -11) \cdot (x-2, y+1) = 0 \Leftrightarrow \underline{\underline{5x - 11y = 21}} \text{ ger normallinjen.}$$

6.4) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 = 1$.

$$\nabla f = (2x + y, x + 2y)$$



(Ej skalenlig bild!)

a)

Vill hitta de punkter (a,b) på ellipsen, d.v.s.

sådana att $a^2 + ab + b^2 = 1$ och sådana att

$(a,b) - (0,2) = (a, b-2)$ tangerar ellipsen,

d.v.s. sådana $\nabla f(a,b) \cdot (a, b-2) = 0$.

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 1 \\ \nabla f(a,b) \cdot (a, b-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 1 \\ (2a+b, a+2b) \cdot (a, b-2) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 1 \\ 2a^2 + ab + ab - 2a + 2b^2 - 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1, b = 0 \\ \text{eller} \\ a = -1, b = 1. \end{cases}$$

Tangentlinjerna ges nu av

$$(1,0): \nabla f(1,0) \cdot (x-1, y-0) = (2,1) \cdot (x-1, y) = \underline{\underline{2x + y - 2 = 0}}$$

$$(-1,1): \nabla f(-1,1) \cdot (x+1, y-1) = (-1,1) \cdot (x+1, y-1) = \underline{\underline{-x + y - 2 = 0}}$$

6.4)

b) Vi ser direkt från figuren att det inte finns sådana

c) $(-1, 0)$ ligger på ellipsen

$$\nabla f(-1, 0) \cdot (x+1, y) = (-2, 1) \cdot (x+1, y) = -2x - y - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{2x + y = -2}}$$

6.5)

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - (2/x)^2 = 3 \\ y = 2/x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4/x^2 = 3 \\ y = 2/x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - 4 - 3x^2 = 0 \\ y = 2/x \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x=2, y=1 \\ \text{eller} \\ x=-2, y=-1 \end{cases}$$

Med $f(x, y) = x^2 - y^2$, $g(x, y) = xy$

får vi

$$\nabla f = (2x, -2y), \quad \nabla g = (y, x).$$

$$\nabla f(2, 1) = (4, -2), \quad \nabla g(2, 1) = (1, 2)$$

$$\cos \theta = \frac{\nabla f(2, 1) \cdot \nabla g(2, 1)}{|\nabla f(2, 1)| |\nabla g(2, 1)|} = 0, \quad \text{d.v.s. } \underline{\underline{\theta = \frac{\pi}{2}}}$$

$$\nabla f(-2, -1) = (-4, 2), \quad \nabla g(-2, -1) = (-1, -2)$$

$$\cos \theta = \frac{(-4, 2) \cdot (-1, -2)}{|(-4, 2)| |(-1, -2)|} = 0, \quad \underline{\underline{\theta = \frac{\pi}{2}}}$$

6.6)

a)

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \quad (f(3, -2, -1) = 20 \text{ ok.})$$

$$\nabla f = (2x, 4y, 6z)$$

$$\nabla f(3, -2, -1) = (6, -8, -6) = 2(3, -4, -3)$$

$$(3, -4, -3) \cdot (x-3, y+2, z+1) = \underline{\underline{3x - 4y - 3z - 20 = 0}}$$

b)

$$f(x, y, z) = x^2 y - z = 0 \quad (f(-2, 1, 4) = 0 \text{ ok.})$$

$$\nabla f = (2xy, x^2, -1)$$

$$\nabla f(-2, 1, 4) = (-4, 4, -1)$$

$$(-4, 4, -1) \cdot (x+2, y-1, z-4) = \underline{\underline{-4x + 4y - z - 8 = 0}}$$

6.7)

a) $\nabla f = (f'_x, f'_y)$ pekar i den riktning

i vilken f växer snabbast.

b) $\nabla F = (f'_x, f'_y, -1)$ pekar i normalriktningen.

OBS! Om $F(a, b, c) = 0 \Leftrightarrow c = f(a, b)$

och vi använder den binära approximationen av

$$f: \quad z = f(a, b) + f'_x(a, b)(x-a) + f'_y(a, b)(y-b)$$

$$= c + f'_x(a, b)(x-a) + f'_y(a, b)(y-b)$$

$$\Leftrightarrow (f'_x(a, b), f'_y(a, b), -1) \cdot (x-a, y-b, z-c) =$$

$$= \nabla F(a, b, c) \cdot (x-a, y-b, z-c) = 0$$

6.8) a) $f(x,y) = \ln(x^2 + 2y^2)$

$$\nabla f = \left(\frac{2x}{x^2 + 2y^2}, \frac{4y}{x^2 + 2y^2} \right), \quad \nabla f(2,1) = \left(\frac{4}{4+2}, \frac{4}{4+2} \right) = \frac{2}{3} (1,1).$$

OBS: $\left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right| = 1.$

Med $\bar{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ för $\bar{v}$

$$f'_{\bar{v}}(2,1) = \nabla f(2,1) \cdot \bar{v} = \frac{2}{3} (1,1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \underline{\underline{\frac{2\sqrt{2}}{3}}}$$

b) Med $\bar{v} = \frac{(1,2)}{|(1,2)|} = \frac{1}{\sqrt{5}} (1,2)$ för $\bar{v}$

$$f'_{\bar{v}}(2,1) = \nabla f(2,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (1,2) = \frac{2}{3} (1,1) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (1,2) = \underline{\underline{\frac{2}{\sqrt{5}}}}$$

6.9) $f(x,y,z) = xy^2z^3.$

$$\nabla f = (y^2z^3, 2xy^2z^3, 3xy^2z^2)$$

$$\nabla f(3,2,1) = (4, 12, 36).$$

Riktning $\bar{v} = \frac{-(3,2,1)}{|(3,2,1)|} = -\frac{1}{\sqrt{14}} (3,2,1)$

$$f'_{\bar{v}}(3,2,1) = \nabla f(3,2,1) \cdot \bar{v} = (4, 12, 36) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{14}} (3,2,1) \right) =$$

$$= \underline{\underline{-\frac{72}{\sqrt{14}}}}.$$

6.10) a) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$

a) ∇f

a)

$(2, 2, 2)$

6.10)

$$f(x,y) = xy^2 = 2$$

$$\nabla f = (y^2, 2xy)$$

$$(x,y) \parallel \nabla f(x,y) \Leftrightarrow (y, -x) \cdot \nabla f(x,y) = 0$$

$$\begin{cases} (y, -x) \cdot (y^2, 2xy) = 0 \\ xy^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^3 - 2x^2y = 0 \\ xy^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \dots$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{(x,y) = (1, \pm\sqrt{2})}}$$

6.11)

$$f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2yz = 1$$

$$\nabla f = (2x+2y, 4y+2x+2z, 6z+2y)$$

$$\text{v.u. h.c. } \nabla f \parallel (1, -1, 2)$$

$$\begin{cases} 2x+2y = \lambda \\ 4y+2x+2z = -\lambda \\ 6z+2y = 2\lambda \\ f(x,y,z) = 1 \end{cases} \Rightarrow \dots \Rightarrow \underline{\underline{(x,y,z) = \pm \left(\frac{5}{\sqrt{13}}, \frac{-4}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}} \right)}}$$

6.12) $f(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$

$$\nabla f = (2x, 4y, 6z)$$

$$\begin{cases} ((6,0,0) - (x,y,z)) \cdot (2x, 4y, 6z) = 0 \\ ((0,3,0) - (x,y,z)) \cdot (2x, 4y, 6z) = 0 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 + 4y^2 + 6z^2 = 12x \\ 2x^2 + 4y^2 + 6z^2 = 12y \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12x = 12 \\ 12y = 12 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x,y,z) = (1, 1, \pm 1)$$

$$\nabla f(1,1,1) = (2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$$

$$(1, 2, 3) \cdot (x-1, y-1, z-1) = x+2y+3z-6 = 0$$

$$\nabla f(1,1,-1) = 2(1, 2, -3)$$

$$(1, 2, -3) \cdot (x-1, y-1, z+1) = x+2y-3z-6 = 0$$

6.13)

$$T(x,y) = 3 \arctan(x^2+y) - 10 - \frac{6}{1+x^2+y^2}$$

$$\nabla T = \left(\frac{6x}{1+(x^2+y)^2} + \frac{12x}{(1+x^2+y^2)^2}, \frac{3}{1+(x^2+y)^2} + \frac{12y}{(1+x^2+y^2)^2} \right)$$

$$\nabla T(1,-2) = \dots = \frac{5}{6} (4,1)$$

Riktning $\vec{v} = - \frac{(4,1)}{1(4,1)} = - \frac{1}{\sqrt{17}} (4,1)$ (Avtar snabbast i $-\nabla T$ -riktning).

$$T'_\vec{v}(1,-2) = \nabla T(1,-2) \cdot \vec{v} = \frac{5}{6} (4,1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{17}} (4,1) \right) =$$

$$= -\frac{5 \cdot 17}{6 \sqrt{17}} = -\frac{5\sqrt{17}}{6} \quad (= -|\nabla T|).$$

$$-5\sqrt{17}/6 \approx -3.4^\circ\text{C}/\text{km}$$

$$3 \text{ m/s} = \frac{3 \cdot 60}{1000} \text{ km/min}$$

$$\frac{3 \cdot 60 \cdot 5\sqrt{17}}{6 \cdot 1000} = \frac{3\sqrt{17}}{20} \approx 0.62^\circ\text{C}/\text{min}.$$

6.14)

Normal to the plane

$$((5, -1, 1) - (0, 1, 2)) \times ((1, 3, 0) - (0, 1, 2)) =$$

$$= (5, -2, -1) \times (1, 2, -2) = (6, 9, 12) = 3(2, 3, 4)$$

so $(2, 3, 4)$ normal to the plane. Ekv. $(2, 3, 4) \cdot ((x, y, z) - (0, 1, 2)) = 0$

$$\Leftrightarrow 2x + 3y + 4z = 11$$

$$f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 4z^2 = C$$

$$\nabla f = (2x, 6y, 8z) = 2(x, 3y, 4z).$$

$\nabla f \parallel (2, 3, 4)$ och $f = C$ giv

$$\begin{cases} (x, 3y, 4z) = \lambda(2, 3, 4) \\ x^2 + 3y^2 + 4z^2 = C \\ 2x + 3y + 4z = 11 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \\ 4\lambda^2 + 3\lambda^2 + 4\lambda^2 = 11\lambda^2 = C \\ 4\lambda + 3\lambda + 4\lambda = 11 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 1 \\ C = 11 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

SVAR: $C = 11$.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$$

a)

$$\nabla f = (2x, 2y)$$

$$\nabla f = (0, 0) \Rightarrow$$

$$x = 0$$

$$y = 0$$

$$f(0, 0) = 0^2 + 0^2 + 1 = 1$$

$$f(0, 0) = 1$$

$$f(0, 0) = 1$$

$$f(0, 0) = 1$$

$$f(0, 0) = 1$$

$$f(0, 0) = 1$$

